

# Wpływ ultrafioletu na wodne systemy ekologiczne

## podrozdział pracy magisterskiej

Osobnym tematem jest wpływ ultrafioletu na wodne systemy ekologiczne, które produkują więcej biomasy (104 mld ton rocznie) niż systemy lądowe (100 mld ton rocznie – Niedzielski i Gierczak, 1992). Plankton roślinny naszych mórz i oceanów ma ogromne znaczenie dla całego życia na Ziemi, a także dla równowagi klimatycznej. Organizmy autotroficzne – tak nazywamy organizmy, które czerpią energię ze światła słonecznego i pokrywają swoje zapotrzebowanie na węgiel poprzez pochłanianie CO<sub>2</sub> – są początkiem łańcucha pokarmowego, na końcu którego znajduje się człowiek. Organizmy te wiążą 100 miliardów ton CO<sub>2</sub> rocznie, z czego około 60 miliardów to plankton roślin morskich. Morski łańcuch pokarmowy przebiega w następujących etapach: fitoplankton – zooplankton – skorupiaki – i małe ryby – większe ryby, ssaki morskie – człowiek.

Sam fitoplankton wytwarza około 60 miliardów ton suchej masy rocznie. Taka ilość jest wręcz niewyobrażalna, ale należy zdać sobie sprawę, że biomasa jest redukowana o blisko 90% za każdym razem, gdy przechodzi przez kolejne etapy łańcucha pokarmowego. Oznacza to, że jedna tona fitoplanktonu prowadzi do 100 kilogramów zooplanktonu, co z kolei prowadzi do 10 kilogramów skorupiaków i małych ryb. Biomasa większych ryb, która jest już spożywana przez ludzi, wynosi więc tylko jeden kilogram. Jest to modelowy przykład pełnego łańcucha żywnościowego. Można go jednak skrócić, np. gdy większe zwierzęta (np. wieloryby) żywią się zooplanktonem.

Udowodniono eksperymentalnie, że fitoplankton bardzo wrażliwie reaguje na wzrost promieniowania ultrafioletowego. W praktyce oznacza to, że zwiększony poziom promieniowania UV doprowadzi

nie tylko do śmierci dużej masy planktonu, ale także do poważnych zmian jakościowych – niektóre gatunki będą się rozmnażać, inne całkowicie znikną. W bardzo zróżnicowanym ekosystemie morskim występują gatunki wyspecjalizowane w jednym konkretnym typie planktonu. Wszelkie zmiany w składzie gatunkowym planktonu wpływały zatem również na ekosystemy wyższe. A jednocześnie plankton już cierpi w wyniku rosnącego zanieczyszczenia wód morskich. Pod wpływem światła ultrafioletowego plankton traci również część swojej zdolności do asymilacji dwutlenku węgla. Wzrost średniej temperatury wody morskiej w wyniku efektu cieplarnianego wywołany zwiększonym stężeniem CO<sub>2</sub> doprowadził do wymierania kolejnych mas planktonu. (www.RokitasysUSERS.SZKOLA.pl)

Ultrafiolet (UV) to promieniowanie elektromagnetyczne, które odgrywa istotną rolę w wielu procesach ekologicznych. Jego wpływ na wodne systemy ekologiczne jest złożony i obejmuje zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki, zależne od natężenia promieniowania oraz rodzaju organizmów i warunków środowiskowych. W ekosystemach wodnych, promieniowanie UV dzieli się na trzy zakresy: UV-A, UV-B i UV-C. Spośród nich, UV-C jest najsilniej absorbowane przez atmosferę i rzadko dociera do powierzchni Ziemi. UV-B ma najbardziej negatywne skutki dla organizmów, podczas gdy UV-A jest mniej szkodliwe, ale również wpływa na procesy biologiczne.

Promieniowanie UV-B, ze względu na krótszą długość fali, jest bardziej energetyczne i może powodować uszkodzenia DNA, co prowadzi do mutacji oraz zaburzeń w funkcjonowaniu komórek. W wodnych systemach ekologicznych, organizmy takie jak fitoplankton, zooplankton, ryby i inne organizmy wodne są narażone na bezpośrednie działanie UV-B. Badania wykazały, że UV-B może hamować fotosyntezę w fitoplanktonie, co ma negatywne konsekwencje dla całego łańcucha pokarmowego. Fitoplankton, będący podstawą większości ekosystemów wodnych, jest kluczowym producentem pierwotnym, a wszelkie zaburzenia w jego funkcjonowaniu mogą prowadzić do zmniejszenia

produktywności ekosystemu. Ponadto, zmniejszenie aktywności fitoplanktonu wpływa na zdolność absorbowania dwutlenku węgla z atmosfery, co ma globalne znaczenie w kontekście zmiany klimatu.

Organizmy wodne wykształciły różnorodne mechanizmy obronne przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Wiele gatunków produkuje substancje chemiczne, takie jak mykosporiny i karotenoidy, które działają jako naturalne filtry UV. Dodatkowo, niektóre organizmy potrafią przemieszczać się w głębsze warstwy wody w celu uniknięcia nadmiernego nasłonecznienia. W strefach przybrzeżnych i na płytkich wodach, gdzie penetracja promieni UV jest większa, szczególnie narażone są młode organizmy, których mechanizmy obronne nie są w pełni rozwinięte.

Kolejnym aspektem oddziaływania UV na ekosystemy wodne jest jego wpływ na substancje organiczne rozpuszczone w wodzie. Promieniowanie UV, zwłaszcza UV-B, przyczynia się do fotodegradacji rozpuszczonej materii organicznej, co z jednej strony może zwiększać dostępność składników odżywczych dla mikroorganizmów, ale z drugiej strony prowadzi do produkcji reaktywnych form tlenu (ROS). ROS mogą wywoływać stres oksydacyjny u organizmów, co prowadzi do dalszych uszkodzeń na poziomie komórkowym.

Zmiany klimatyczne i związana z nimi redukcja warstwy ozonowej dodatkowo zwiększają natężenie promieniowania UV docierającego do powierzchni Ziemi, co może nasilić negatywne skutki w ekosystemach wodnych. Szczególnie wrażliwe są ekosystemy polarne, gdzie sezonowe zjawiska, takie jak dziura ozonowa, prowadzą do okresowych wzrostów natężenia UV-B. W tych regionach, organizmy są ewolucyjnie przystosowane do niskich poziomów UV, co sprawia, że gwałtowny wzrost promieniowania może mieć poważne skutki ekologiczne.

Promieniowanie UV, zwłaszcza UV-B, ma znaczący wpływ na wodne systemy ekologiczne. Choć organizmy wodne wykształciły

mechanizmy obronne, zwiększone natężenie promieniowania UV wynikające z antropogenicznych zmian, takich jak zmniejszenie warstwy ozonowej, stanowi poważne zagrożenie dla stabilności tych ekosystemów. Kontynuacja badań nad mechanizmami obronnymi oraz wpływem UV na różne komponenty ekosystemów wodnych jest kluczowa dla zrozumienia przyszłych zmian w tych delikatnych środowiskach.

## **Wpływ ultrafioletu na wodne systemy ekologiczne**

Promieniowanie ultrafioletowe (UV) stanowi naturalny składnik spektrum słonecznego, który odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu biosfery. Pomimo że w większości przypadków pełni funkcję regulacyjną i wpływa na podstawowe procesy biologiczne, jego nadmierna intensywność może prowadzić do degradacji struktur komórkowych organizmów oraz zakłócenia równowagi ekosystemów. Szczególnie wrażliwe na skutki podwyższonego promieniowania UV są wodne systemy ekologiczne, w których interakcje między środowiskiem abiotycznym i biotycznym są wyjątkowo złożone. W ostatnich dekadach, wraz ze zjawiskiem osłabienia warstwy ozonowej, zagadnienie wpływu promieniowania UV na środowisko wodne stało się jednym z kluczowych tematów badawczych w ekologii i ochronie środowiska.

## **Ultrafiolet jako czynnik środowiskowy w ekosystemach wodnych**

Promieniowanie UV, a szczególnie jego zakres UV-B (280–315 nm), ma zdolność przenikania do warstw powierzchniowych wód słodkich i morskich, co w znacznym stopniu determinuje życie organizmów zamieszkujących strefę eufotyczną. Głębokość penetracji zależy od czystości wody, zawartości substancji organicznej, obecności fitoplanktonu oraz stopnia zmaczenia. W wodach oligotroficznym, charakteryzujących się dużą

przejrzystością, promieniowanie UV może docierać na znaczne głębokości, oddziałując na organizmy zamieszkujące nie tylko powierzchnię, ale także niższe warstwy toni wodnej. W wodach eutroficznych natomiast jego zasięg jest znacznie ograniczony, co wynika z większej koncentracji cząstek zawieszonych oraz substancji rozpuszczonych absorbujących promieniowanie.

Promieniowanie UV wpływa zarówno na procesy fizyczno-chemiczne w wodzie, takie jak fotoliza związków organicznych i nieorganicznych, jak i na funkcjonowanie organizmów wodnych. Reakcje fotochemiczne indukowane przez UV mogą prowadzić do powstawania reaktywnych form tlenu, które z kolei oddziałują na skład chemiczny wody i metabolizm organizmów. Umiarkowane ilości UV mogą wspierać procesy samooczyszczania wód poprzez inicjację fotolizy zanieczyszczeń organicznych, jednak ich nadmiar powoduje niepożądane skutki biologiczne.

## **Oddziaływanie promieniowania UV na organizmy wodne**

Organizmy wodne wykazują zróżnicowaną wrażliwość na promieniowanie UV, co jest uzależnione od ich budowy, fazy rozwoju, sposobu życia i zdolności adaptacyjnych. Szczególnie podatne na uszkodzenia są fitoplankton, zooplankton oraz larwy ryb i bezkręgowców. Promieniowanie UV może powodować uszkodzenia DNA, zakłócenia procesów fotosyntezy, denaturację białek oraz uszkodzenia błon komórkowych. Dla fotosyntetyzujących mikroorganizmów, takich jak fitoplankton, zbyt duża dawka UV prowadzi do ograniczenia produkcji pierwotnej, co ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego ekosystemu, ponieważ fitoplankton stanowi podstawę wodnych łańcuchów troficznych.

W przypadku zooplanktonu obserwuje się zmniejszenie tempa wzrostu, redukcję sukcesu rozrodczego oraz zwiększoną śmiertelność. Szczególnie wrażliwe są gatunki powierzchniowe, które naturalnie narażone są na bezpośredni kontakt ze

światłem słonecznym. Larwy wielu gatunków ryb i bezkręgowców cechują się słabo rozwiniętymi systemami ochronnymi, dlatego ich przeżywalność jest istotnie obniżana przy zwiększonej ekspozycji na UV. W skrajnych przypadkach promieniowanie UV może prowadzić do zakłóceń w strukturze populacji, ograniczając możliwości odnowy biocenoz wodnych.

Mimo negatywnych skutków, część organizmów wodnych wykształciła mechanizmy obronne przed promieniowaniem UV, takie jak produkcja pigmentów ochronnych (np. melanina, karotenoidy), zdolność do naprawy DNA dzięki enzymom fotoliazowym czy zmiana zachowań, polegająca na migracji pionowej w toni wodnej. Mechanizmy te jednak nie zawsze są wystarczające, szczególnie w warunkach gwałtownych zmian środowiskowych.

## **Skutki ekologiczne i biogeochemiczne**

Promieniowanie UV oddziałuje nie tylko na poszczególne organizmy, ale również na całe ekosystemy wodne. Ograniczenie produkcji pierwotnej fitoplanktonu prowadzi do zmniejszenia dopływu energii do wyższych poziomów troficznych, co może skutkować spadkiem biomasy zooplanktonu, ryb oraz innych organizmów wodnych. Długoterminowe zmiany tego typu wpływają na stabilność ekosystemu, prowadząc do obniżenia jego odporności na stres środowiskowy i zaburzeń funkcjonowania sieci troficznych.

Zwiększone promieniowanie UV wpływa także na cykle biogeochemiczne, w tym przede wszystkim cykl węgla i azotu. Fotoliza rozpuszczonej materii organicznej może zwiększać produkcję dwutlenku węgla, przyczyniając się do zakwaszenia wód oraz wzrostu emisji CO<sub>2</sub> do atmosfery. Zmiany te mogą mieć globalne konsekwencje klimatyczne, co nadaje zagadnieniu dodatkowy wymiar.

Wpływ promieniowania ultrafioletowego na wodne systemy ekologiczne jest złożony i obejmuje zarówno procesy

biologiczne, jak i chemiczne. Zwiększona ekspozycja na UV, wynikająca m.in. z redukcji warstwy ozonowej i zmian klimatycznych, stanowi poważne zagrożenie dla organizmów wodnych, szczególnie tych najniższych w łańcuchu troficznym. Ograniczenie produkcji pierwotnej, zaburzenia w populacjach zwierząt planktonowych oraz zmiany w cyklach biogeochemicznych mogą prowadzić do degradacji całych ekosystemów wodnych. Zrozumienie tych procesów oraz wdrażanie działań ochronnych, takich jak redukcja emisji substancji niszczących ozon czy monitorowanie jakości wód, stanowi podstawę dla zachowania równowagi ekologicznej i ochrony zasobów wodnych w dobie globalnych zmian środowiskowych.

Problem efektu cieplarnianego zostanie omówiony w następnym podrozdziale.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu pracy z zakresu ochrony środowiska, to polecamy serwis [pisanie prac](#) - prace z ekologii i innych kierunków pisane na (prawie) każdy temat.